

分類	レジメン名称	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	コース期間
乳がん分子標的薬 (-)	乳癌 AC療法	ドキシルピシン塩酸塩注射液 50mg	60mg/m ²	5分かけて	day1	3週間毎
		注射用エンドキサン 100mg	600mg/m ²	30分かけて	day1	
	乳癌 wPAC療法	パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	80mg/m ²	1 時間かけて	day1	1週間毎
	乳癌 ハラヴェン単剤療法	ハラヴェン静注1mg/2mL	1.4mg/m ²	5分かけて	day1、8	3週間毎
	乳癌 GEM単剤療法	ゲムシタピン点滴静注用 1g/25mL	1250mg/m ²	30分かけて	day1、8	3週間毎
	乳癌 3wDOC75療法	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL	75mg/m ²	1 時間かけて	day1	3週間毎
	乳癌 VNR療法	ナベルピン注 10mg/1mL	25mg/m ²	10分かけて	day1、8	3週間毎
	乳癌 TC療法	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL	75mg/m ²	1 時間かけて	day1	3週間毎
		注射用エンドキサン 100mg	600mg/m ²	30分かけて	day1	
	乳癌 FEC100療法	エビルピシン塩酸塩注射液 50mg	100mg/m ²	5分かけて	day1	3週間毎
注射用エンドキサン 100mg		500mg/m ²	30分かけて	day1		
フルオロウラシル注1000mg/20mL		500mg/m ²	30分かけて	day1		
乳がん分子標的薬 (+)	乳癌 wPAC療法+アバスチンQ2w療法 初回	パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	80mg/m ²	1 時間かけて	day1	1週間毎
		アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	10mg/kg	90分かけて	day1	
	乳癌 wPAC療法+アバスチンQ2w療法 2回目	パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	80mg/m ²	1 時間かけて	day1	1週間毎
		アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	10mg/kg	1 時間かけて	day1	
	乳癌 wPAC療法+アバスチンQ2w療法 3回目以降	パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	80mg/m ²	1 時間かけて	day1、8、15	4週間毎
		アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	10mg/kg	30分かけて	day1、15	
乳癌 Atezolizumab+nab-PTX療法 (初回投与時; Atezo. 60分)	テセントリク点滴静注 840mg/14mL	840mg/Body	60分かけて	day1	1週間毎	
	アブラキサン点滴静注用 100mg	100mg/m ²	30分かけて	day1		
乳癌 Atezolizumab+nab-PTX療法 (2回目以降; Atezo. 30分)	テセントリク点滴静注 840mg/14mL	840mg/Body	30分かけて	day1、15	4週間毎	
	アブラキサン点滴静注用 100mg	100mg/m ²	30分かけて	day1、8、15		
乳がん抗HER2薬	乳癌 3wTmab単剤療法 導入	トラスツマブBS点滴静注用 150mg	8mg/kg	1.5時間かけて	day1	3週間毎
	乳癌 3wTmab単剤療法 維持	トラスツマブBS点滴静注用 150mg	6mg/kg	30分かけて	day1	3週間毎
	乳癌 wTmab/wPAC併用療法 導入	トラスツマブBS点滴静注用 150mg	4mg/kg	1.5 時間かけて	day1	1週間毎
		パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	80mg/m ²	1 時間かけて	day1	
	乳癌 wTmab/wPAC併用療法 維持	トラスツマブBS点滴静注用 150mg	2mg/kg	30分かけて	day1	1週間毎
		パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	80mg/m ²	1 時間かけて	day1	
	乳癌 3wTmab/wPAC併用療法 導入	トラスツマブBS点滴静注用 150mg	8mg/kg	1.5 時間かけて	day1	3週間毎
		パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	80mg/m ²	1 時間かけて	day1、8、15	
	乳癌 3wTmab/wPAC併用療法 維持	トラスツマブBS点滴静注用 150mg	6mg/kg	30分かけて	day1	3週間毎
		パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	80mg/m ²	1 時間かけて	day1、8、15	
	wPAC+3W Tmab 導入/P導入併用療法	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	840mg/Body	1 時間かけて	day1	3週間毎
		トラスツマブBS点滴静注用 150mg	8mg/kg	90分かけて	day1	
		パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	80mg/m ²	1 時間かけて	day1、8、15	
	wPAC+3W Tmab 維持/P維持併用療法	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	420mg/Body	30分かけて	day1	3週間毎
		トラスツマブBS点滴静注用 150mg	6mg/kg	30分かけて	day1	
		パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	80mg/m ²	1 時間かけて	day1、8、15	
	3W パージェタ初回/トラスツマブBS初回併用療法	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	840mg/Body	1 時間かけて	day1	3週間毎
		トラスツマブBS点滴静注用 150mg	8mg/kg	90分かけて	day1	
	3W パージェタ維持/トラスツマブBS初回併用療法	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	420mg/Body	30 分かけて	day1	3週間毎
		トラスツマブBS点滴静注用 150mg	8mg/kg	90 分かけて	day1	
	3W パージェタ維持/トラスツマブBS維持併用療法	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	420mg/Body	30分かけて	day1	3週間毎
		トラスツマブBS点滴静注用 150mg	6mg/kg	30分かけて	day1	
	乳癌 3wTmab/3wDOC 併用療法導入	トラスツマブBS点滴静注用 150mg	8mg/kg	1.5 時間かけて	day1	3週間毎
		ドセタキセル点滴静注80mg/4mL	75mg/m ²	1 時間かけて	day1	
	乳癌 3wTmab/3wDOC 併用療法維持	トラスツマブBS点滴静注用 150mg	6mg/kg	30分かけて	day1	3週間毎
		ドセタキセル点滴静注80mg/4mL	75mg/m ²	1 時間かけて	day1	
	3W DOC+3W Tmab 導入/P導入併用療法	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	840mg/Body	1 時間かけて	day1	3週間毎
		トラスツマブBS点滴静注用 150mg	8mg/kg	90分かけて	day1	
		ドセタキセル点滴静注80mg/4mL	75mg/m ²	1 時間かけて	day1	
	3W DOC+3W Tmab 維持/P維持併用療法	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	420mg/Body	30分かけて	day1	3週間毎
トラスツマブBS点滴静注用 150mg		6mg/kg	30分かけて	day1		
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL		75mg/m ²	1 時間かけて	day1		
乳癌 カドサイラ導入	カドサイラ点滴静注用 100mg	3.6mg/kg	90分かけて	day1	3週間毎	
乳癌 カドサイラ維持	カドサイラ点滴静注用 100mg	3.6mg/kg	30分かけて	day1	3週間毎	
乳がん エンハーツ 導入	エンハーツ点滴静注用 100mg	5.4mg/kg	90分かけて	day1	3週間毎	
乳がん エンハーツ 維持	エンハーツ点滴静注用 100mg	5.4mg/kg	30分かけて	day1	3週間毎	
乳癌 wTmab/VNR療法 導入	トラスツマブBS点滴静注用 150mg	4mg/kg	1.5 時間かけて	day1	1週間毎	
	ナベルピン注 10mg/1mL	25mg/m ²	10分かけて	day1		
乳癌 wTmab/VNR療法 維持	トラスツマブBS点滴静注用 150mg	2mg/kg	30分かけて	day1	1週間毎	
	ナベルピン注 10mg/1mL	25mg/m ²	10分かけて	day1		
乳がんホルモン療法	フェソロデックス (1回/2回目)	フェソロデックス筋注 250mg/5mL	1筒/Body	右殿部 1~2分以上	day1×2	2週間毎
	フェソロデックス (3回目以降)	フェソロデックス筋注 250mg/5mL	1筒/Body	右殿部 1~2分以上	day1×2	4週間毎

分類	レジメン名称	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	コース期間
肉腫	肉腫 ドキソルピシン	ドキソルピシン塩酸塩注射用 50mg	75mg/m ²	30分かけて	day1	3週間毎
原発不明癌	TC (PTX180 CBDCA AUC6 3w)	パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL	180mg/m ²	3 時間かけて	day1	3週間毎
		カルボプラチン注射液 150mg/15mL	6mg/GFR+25	1 時間かけて	day1	